

РЕБАГИТ

(РЕБАМИПИД)

РЕКОМЕНДОВАН МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРИТА¹



Пациентам с хроническим гастритом и симптомами диспепсии для купирования этих симптомов рекомендуется лечение ребамипидом (100 мг 3 раза в сутки в течение 2–4 недель, при необходимости 8 недель) как в монотерапии, так и в составе комплексного лечения



Уровень убедительности рекомендаций — А

Уровень достоверности доказательств — 1


КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Синдром повышенной эпителиальной проницаемости участвует в патогенезе гастрита, а медикаментозная терапия, оказывающая цитопротективный эффект, патогенетически обоснована



РЕБАГИТ СПОСОБСТВУЕТ УСТРАНЕНИЮ ПОВЫШЕННОЙ ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ НА ТРЕХ СТРУКТУРНЫХ УРОВНЯХ И НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ЖКТ²



Способствует:

- *Восстановлению физиологического уровня слизи*
- *Репарации плотных контактов между эпителиоцитами*
- *Устранению воспаления*
- *Восстановлению кровоснабжения*

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС ТЕРАПИИ

8 НЕДЕЛЬ ПО 1 ТАБЛЕТКЕ 3 РАЗА В ДЕНЬ

В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ