

МУКОСАТ®

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ¹ ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ ОСТЕОАРТРИТА²



Полный цикл собственных доклинических и клинических исследований³



Эталонная субстанция Bioiberica (Испания)⁴



Комфорт применения за счет запатентованной вязкости⁵



Включен в клинические рекомендации, опубликованные в рубрикаторе Минздрава России²



30 лет истории бренда*

Применение препарата Мукосат® при остеоартрите коленного сустава II-III рентгенологической стадии⁶

На фоне терапии отмечено

- Выраженное снижение боли в покое, при движении, уменьшение частоты проявления синовита;
- Отмена или снижение дозы/кратности приема НПВП у 87,9% пациентов.



Открытое неконтролируемое наблюдательное исследование
Куратор д.м.н. А.Е. Каратеев, ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва

Мукосат® по МНН входит в клинические
рекомендации рубрикатора Минздрава России²



ID 666 Коксартроз




ID 667 Гонартроз



Применение препарата Мукосат® при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника⁷

Динамика выраженности боли по шкале ВАШ у пациентов с хронической болью в спине



- Снижение выраженности боли на 40% через месяц и на 60% через 2 месяца терапии, сохранение эффекта через месяц после окончания курса
- 87% пациентов не испытывали боль, либо она регистрировалась как слабая

Открытое проспективное многоцентровое исследование эффективности и безопасности терапии препаратом Мукосат® без группы контроля
Куратор: Ан.Б. Данилов, д.м.н. профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

Мукосат® по МНН входит в клинические рекомендации рубрикатора Минздрава России²

ID 616 Хроническая боль

у пациентов пожилого
и старческого возраста



ID 600 Падения

у пациентов пожилого
и старческого возраста



МУКОСАТ®

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ¹



- **Положительный эффект после 7-11 инъекций⁸**
- **Сохранение эффекта терапии до 6 месяцев⁸**

МУКОСАТ® Регистрационный номер: P N000570/01

МНН, группировочное наименование:

хондроитина сульфат

Фармакотерапевтическая группа:

репарации тканей стимулятор

Показания к применению:

дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника: остеоартроз периферических суставов, межпозвонковый остеохондроз и остеоартроз. Для ускорения формирования костной мозоли при переломах.

Противопоказания:

повышенная чувствительность к хондроитина сульфату или любому вспомогательному веществу препарата; кровотечения и склонность к кровоточивости; тромбофлебиты; при внутрисуставном введении: наличие активных воспалительных или инфекционных процессов в суставе, наличие активного заболевания кожи или кожной инфекции в области предполагаемой инъекции; детский возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания (эффективность и безопасность не установлены).

С осторожностью: одновременное применение препарата с антикоагулянтами прямого действия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно усиление действия непрямыми антикоагулянтами, антиагрегантами, фибринолитиками.

Побочное действие:

аллергические реакции (кожный зуд, эритема, крапивница, дерматит), геморрагии в месте инъекции.

Лекарственная форма:

раствор для внутримышечного и внутрисуставного введения

Состав:

действующее вещество — хондроитина сульфат

(натриевая соль) в пересчете на сухое вещество 100 мг.

Вспомогательные вещества:

спирт бензиловый 9 мг, вода для инъекций до 1 мл.

Способ применения и дозы:

Препарат Мукосат® вводят внутримышечно по 1 мл через день. При хорошей переносимости дозу увеличивают до 2 мл, начиная с четвертой инъекции. Курс лечения — 25–30 инъекций. При необходимости возможно проведение повторных курсов через 6 месяцев. Для формирования костной мозоли курс лечения составляет 3–4 недели (10–14 инъекций через день). При остеоартрозе крупных суставов возможно сочетание внутрисуставного и внутримышечного способов введения. Проводят до 5 внутрисуставных инъекций по 200 мг с перерывом 3 дня между введениями и 16 внутримышечных инъекций по 200 мг с интервалом 1 день между введениями (через день).

Положительный эффект наблюдается уже через 2-3 недели после начала введения препарата.

Терапевтический эффект сохраняется длительное время (3–6 месяцев) после окончания курса лечения.

Особые указания:

при совместном применении препарата с непрямыми антикоагулянтами, антиагрегантами, фибринолитиками требуется более частый контроль показателей свертывания крови. В случае развития аллергических реакций или появления геморрагий лечение следует прекратить.

*Выписка из протокола № 11 заседания Фармакологического комитета Министерства здравоохранения СССР от 25.05.1992 г. «О результатах клинических испытаний препарата МУКОСАТ». 1. п. 10.1 ст. 4 Федеральный закон от 12.04.2010 г. N 61-ФЗ (ред. от 14.07.2022 г.) «Об обращении лекарственных средств» 2. «Золотой стандарт» является художественным образом. Рубрикатор клинических рекомендаций Минздрава России, электронный ресурс <https://cr.minzdrav.gov.ru/>. Дата обращения 10.08.2022 г. 3. Отчеты о проведенных доклинических и клинических исследованиях в регистрационном досье держателя РУ. 4. Госреестр лекарственных средств, электронный ресурс <https://grls.rosminzdrav.ru>, дата обращения 10.08.2022 г. 5. Характеристическая вязкость натриевой соли хондроитина сульфата, равная 0,01–0,05 м³/кг, позволяет уменьшить риск болезненности инъекций, возникновения уплотнений и геморрагий в месте инъекции. Патент № 2612014 «Средство для лечения артрологических заболеваний». 6. Погожева Е.Ю., Каратеев А.Е. Оценка эффективности инъекционной формы хондроитина сульфата при остеоартрите коленного сустава в реальной клинической практике. Современная ревматология. 2019;13(3):130–134. 7. Рогожин А.А., Данилов А.Б. Результаты открытого проспективного многоцентрового исследования без группы контроля эффективности и безопасности терапии препаратом Мукосат® пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника. Manage Pain.2020.№2:3–10 8. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Мукосат® раствор для внутримышечного введения P №000570/01.

Информация предназначена для медицинских и фармацевтических работников.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.