

РИКСИЯ®

ЭТОРИКОКСИБ 60, 90, 120 МГ



БРИЛЛИАНТОВОЕ* ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ



Высокоселективный НПВП**1

Способен снижать индекс центральной сенситизации²

Имеет собственную доказательную клиническую базу (более 800 пациентов)^{2,3}

РУ. ЛП-005636-080719 от 25.03.21

* Эторикоксиб обладает несколькими эффектами (гранями), оказывает обезболивающее действие. Влияет на элементы центральной сенситизации. Источники: Arendt-Nielsen L, Egsgaard LL, Petersen KK. Evidence for a central mode of action for etoricoxib (COX-2 inhibitor) in patients with painful knee osteoarthritis. Pain. 2016;157(8):1634-44. doi:10.1097/j.pain.0000000000000562.

** нестероидный противовоспалительный препарат

1. Patrignani P, Capone ML, Tacconelli S. Clinical pharmacology of etoricoxib: a novel selective COX2 inhibitor. Expert Opin Pharmacother. 2003 Feb;4(2):265-84. doi:10.1517/14656566.4.2.265. PMID: 1256237.

2. Каратеев АЕ, Полищук БО, Филатова ЕС и др. Современная ревматология. Результаты открытого многоцентрового неинтервенционного исследования клинической эффективности и переносимости эторикоксиба при остеоартрите и неспецифической боли в спине с дополнительной оценкой влияния препарата на «центральные» проявления боли. 2022;16(2):34-42. DOI: 10.14412/1996-7012-2022-2-34-42.

3. Парфенов В.А., Рожков Д.О., Шевцова К.В., Гринюк В.В. Результаты клинического неинтервенционного исследования Эльбрус. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2022;14(5): DOI:10.14412/2074-2711-2022-5.

Сокращенная информация по медицинскому применению лекарственного препарата Риксия**

МНН: эторикоксиб. **Лекарственная форма:** таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг, 60 мг, 90 мг, 120 мг. **Показания к применению:** лечение хронической боли в нижней части спины; симптоматическая терапия остеоартрита; ревматоидного артрита; анкилозирующего спондилита; боли и воспаления, связанных с острым подагрическим артритом; краткосрочная терапия умеренной острой боли после стоматологических операций. **Противопоказания:** повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата; сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа, или околоносовых пазух и непереносимости АСК и других НПВП; язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения, активное желудочно-кишечное кровотечение; воспалительные заболевания кишечника; XCH (II – IV функциональный класс по NYHA); тяжелые нарушения функции печени, почек; гиперкалиемия; ИБС, заболевания периферических артерий, цереброваскулярные заболевания; дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность, период грудного вскармливания; детский возраст до 16 лет; неконтролируемая артериальная гипертензия. **С осторожностью:** следует применять у групп пациентов при следующих состояниях: повышенный риск развития осложнений со стороны ЖКТ вследствие приема НПВП, пожилого возраста, одновременно принимающие другие НПВП, факторы риска сердечно-сосудистых осложнений в анамнезе; нарушения функции печени легкой степени тяжести; нарушения функции почек; у пациентов с дегидратацией, сопутствующая терапия антикоагулянтами, антиагрегантами, препаратами, которые метаболизируются сульфотрансферазами. **Способ применения и дозы:** внутрь, независимо от приема пищи, запивая небольшим количеством воды. Рекомендуемая доза при остеоартрите 30 – 60 мг 1 раз в день, ревматоидном артрите и анкилозирующем спондилите 60 – 90 мг 1 раз в день, при хронической боли в нижней части спины 60 мг 1 раз в день (не более 12 недель), острым подагрическим артритом 120 мг 1 раз в день (не более 8 дней), при состояниях, сопровождающихся острой болью, эторикоксиб следует применять только в острый симптоматический период, при острой боли после стоматологических операций – 90 мг 1 раз в день (не более 3 дней). **Побочное действие:** альвеолярный остит, отеки/задержка жидкости, головокружение, головная боль, аритмия, ощущение сердцебиения, артериальная гипертензия, бронхоспазм, боль в животе, запор, метеоризм, гастрит, изжога / гастроэзофагиальный рефлюкс, диарея, диспепсия / дискомфорт в эпигастрии, тошнота, рвота, язвы слизистой оболочки полости рта, повышение активности аланиламинотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ), экимоз, астения/слабость, гриппоподобный синдром. **Срок годности:** 3 года. **Условия отпуска:** отпускают по рецепту. **Полная информация по препарату представлена в инструкции по медицинскому применению ЛП-005636-080719, изм. №1-3, последнее изменение от 25.03.21.**

*Полная информация - см. инструкцию по медицинскому применению препарата Риксия®.

За дополнительной информацией обращаться в АО «РАНБАКСИ» (группа компаний SUN PHARMA), Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электровзводская, д. 27, стр. 8, пом. 14/1, тел. +7 (495) 234-51-70, <https://sunpharma.com/russia/>, E-mail: drugsafety.russia@sunpharma.com. При возникновении возможных нежелательных реакций (НР) просим информировать об этом нашего регионального представителя, а также обращаться к специалисту по фармаконадзору по телефону: +7 (495) 234-51-70 (доб.4) или по электронной почте: drugsafety.russia@sunpharma.com.



ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ